

Juillet 1867.

LISTE
DES REPTILES NOUVEAUX

DÉCOUVERTS, EN 1866,

SUR LA COTE SUD-OUEST DE MADAGASCAR,

PAR ALFRED GRANDIDIER.

CHÉLONIENS.

DUMERILIA. — Gen. nov. — Capite lato, depresso, non sulcato; oculis lateralibus; mandibula robusta, subuncinata, non denticulata. Scutis temporalibus magnis. Testa oblonga, curvata, retro depressa; scuto nuchali nullo. Pedibus maxime palmatis, anterioribus 5, posterioribusque 4-ungulatis. Pelle nuda, tuberculis sparsa; duobus cirrhis brevibus sub mento; pedibus posterioribus squamis duabus magnis rotundatis. Cauda inunguiculata et superne cum squamis obliquis et lunaribus in geminata serie.

Ce genre se distingue du Peltocéphale par une tête moins forte et une queue inunguiculée, des Podocnémydes par des mâchoires puissantes et crochues et la carapace non carénée.

Dumerilia madagascariensis. — Capite brunneo, aurantio-flavido, vermiculato; collo pedibusque nigrescentibus. Testa supra brunnea minutissimis punctis aurantiis distincta, subtus rubro-brunnea, partito-flava. — Long. testæ, 0^m,35.

Hab. Mouroundava Tsidsibonque flumina in occidentali insula Madagascar littore.

Testudo planicauda. — ♂ Supra brunneo-nigra; scutorum areolis granulosis ochreis, rarisque radiis ab illis divergentibus, flavidis; scutis flavo cinctis. Scuto nuchale parvo, caudale unico; secundo tertioque dorsale omnino planis. Infra flava, areolis nigro maculatis. Sterno latissimo, antice paulo longiore testa. Capite brunneo flavis maculis; cauda maxime depressa, extrema parte squamis magnis tecta. — Long. testæ, 0^m,15.

Hab. Mouroundava.

→ Homopholis SAURIENS. sp. n.

Platydoctylus
Bovini.

Hemidactylus Sakalava. — Pollicibus non truncatis, lamellis hypodactylorum integris. Tuberculis rotundatis, numerosis, sparsis. Aculeis caudalibus per series transversales. Pallide cinereus, sex nigris fasciis dorsalibus obsoletis transversim notatus. — Long. e nasi apice ad basin caudæ, 0^m,06; caudæ, 0^m,09.

Hab. Tullear.

→ Paroedura sp. n.

Phyllodactylus androyensis. — Superne griseus, lateribus rubro-brunneis; in dorso quatuor paribus macularum reniformium, prima pare frenum attingente. Capite griseo, cum nigra macula. Infra albidus. Tuberculis triangularibus. Cauda brevi in turbinis forma, rugosa. Hypodactylis granulosis. — Long. e nasi apice ad basin caudæ, 0^m,035; caudæ, 0^m,02.

Hab. Sanctæ Mariæ promontorium.

GECKOLEPIS. — Gen. nov. — Gecko supra infraque squamis scincoidiorum modo tectus. Capite obtuso, pedibus brevissimis. Digitis platydoctylorum modo striatis.

Geckolepis typicus. ^{sp. n.} — Supra rubro-ardesiacus, infra grisescens. Cauda depressa, in lateribus non denticulata. Corpore squamis rotundatis imbricatis, cauda ovatus, omnibus punctis minutissimis nigris distinctis. Menti scutum acutum et in utroque latere duo inæqualia; postea squamæ dorsalibus similes. — Long. e nasi apice ad basin caudæ, 0^m,04; caudæ, 0^m,04.

Hab. Sanctæ Mariæ promontorium.

Gerrhosaurus 4-lineatus. ^{sp. n.} — Supra umbrato-brunneus; lineis quatuor albido-flavis, duabus e naso ad apicem caudæ, duabus e nucha ad tertiam caudæ partem. Infra aurantio-miniatus. Capite albida macula distincto; pedibus corpore concoloribus, albidis punctis notatis. — Long. e nasi apice ad basin caudæ, 0^m,14; caudæ, 0^m,18.

Hab. Tullear.

Musya

— 3 —

Euprepes aureo-punctatus. ^{Sp. n.} — Supra nigro-brunneus; capite nu-
chaque flaris. dorso vix nigris punctis. maculatis. Cauda corpore
concolore. Infra flavido-albus. — Long. corporis caudæque, 0^m,08.

Hab. Saloubé, in media insula Madagascar.

Amphiglossus
Gongylus igneocaudatus. ^{Sp. n.} — Supra brunneus; in lateribus flavi-
dis. tribus lineis nigris, superiore latissima, inferiore tenuissima.
Partibus inferioribus albis. Cauda perlucida rubra. — Long. e uasi
apice ad basin caudæ, 0^m,04; caudæ, 0^m,055.

Hab. Tullear. Vita subterranea.

PYGOMELES. — Gen. nov. — Præpedito similis, sed auribus minimis;
corpore anguiforme; extremitatibus anterioribus nullis, posteriori-
bus parvissimis, compressis indivisisque. Capite cuneato; dentibus
conicis; palato edentato; lingua tota squamea, non transversim sul-
cata nec antice emarginata. Squamis non striatis.

Pygomeles Braconnieri. ^{Sp. n.} — Supra argenteus; squamis dorsi
laterumque puncto brunneo-nigro centrali totatis, his punctis decem
vel duodecim lineas longitudinales formantibus. Infra albus. Capite
nigro maculato. — Long. e nasi apice ad basin caudæ, 0^m,14; caudæ,
0^m,09.

Hab. Tullear. Vita subterranea.

Je dédie cette espèce à M. Braconnier, bien connu de
tous ceux qui s'occupent d'erpétologie.

OPHIDIENS.

Psammophis mahfalensis. ^{Sp. n.} — Supra brunneo-griseus, lineis dua-
bus nigris dorsalibus angulatis. Infra griseus.

Hab. Machikora et Anhoulabé.